

51

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENTAMT



Int. Cl.:

C 07 c, 175/00

C 07 d, 29/20

C 07 d, 87/34

52

Deutsche Kl.:

12 o, 25

12 p, 1/01

12 p, 3

10

11

# Offenlegungsschrift 2 300 107

21

Aktenzeichen: P 23 00 107.2

22

Anmeldetag: 3. Januar 1973

43

Offenlegungstag: 11. Juli 1974

Ausstellungspriorität: —

30

Unionspriorität

32

Datum: —

33

Land: —

31

Aktenzeichen: —

54

Bezeichnung:

Vitamin A-Säureamide

61

Zusatz zu: —

62

Ausscheidung aus: —

71

Anmelder:

BASF AG, 6700 Ludwigshafen

Vertreter gem. §16 PatG: —

72

Als Erfinder benannt:

König, Horst, Dr.; Peh, Jutta, Dr.med. vet.; Scholz, Herbert, Dr.;  
6700 Ludwigshafen; Paust, Joachim, Dr., 6701 Neuhofen

DT 2 300 107


Vitamin A-Säureamide

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Vitamin A-Säureamide.

Amidderivate der Vitamin A-Säure sind bekannt. Beispielsweise wird von H.O. Huisman et al in den Recueil 77, 97 (1958) das Vitamin A-Säureisobutylamid beschrieben. Weiterhin wird von H.A. Staab in den Liebigs Ann. Chem. 654, 128 (1962) das Vitamin A-Säureimidazolid beschrieben.

Aus der deutschen Offenlegungsschrift 2 102 586 sind Vitamin A-Säureamide bekannt, die zur Prophylaxe und Therapie von Karzinomen, Akne oder anderen dermatologischen Affektionen verwendet werden.

Die Erfindung betrifft neue Vitamin A-Säureamide der allgemeinen Formel I



in der  $R^1$  Wasserstoff und  $R^2$  eine Alkylgruppe mit mehr als 10 C-Atomen, eine substituierte Phenylgruppe, eine Naphthylgruppe, eine Cycloalkylgruppe oder ein polycyclischer Alkylrest oder  $R^1$  eine niedere Alkylgruppe und  $R^2$  einen cycloaliphatischen Ring oder  $R^1$  und  $R^2$  zusammen mit dem sie verbindenden Stickstoffatom einen Ring, der gegebenenfalls ein weiteres Heteroatom enthält, bedeuten.

Bei den erfindungsgemäßen Vitamin A-Säureamiden, in denen  $R^1$  Wasserstoff bedeutet, handelt es sich dementsprechend um sekundäre Amide der Vitamin A-Säure. Eine weitere Gruppe erfindungsgemäßer Vitamin A-Säureamide stellen tertiäre Amide der Vitamin A-Säure dar.

Für  $R^2$  kommen als Alkylreste mit mehr als 10 C-Atomen insbesondere solche mit 11 bis 20 C-Atomen, der Undecyl-, Dodecyl-, Tridecyl-, Tetradecyl-, Pentadecyl-, Hexadecyl-, Heptadecyl-, Octadecyl-, Nonadecyl- oder Eicosylrest, in Betracht. Als polycyclischer Alkylrest ist insbesondere der Adamantylrest zweckmäßig.

Als substituierte Phenylgruppen für  $R^2$  kommen bevorzugt Phenylgruppen in Betracht, die durch eine oder mehrere niedere Alkylgruppen mit 1 bis 4 C-Atomen, wie Methyl, Äthyl, Propyl, Butyl, Isobutyl, Halogenatome, wie Fluor, Chlor, Brom oder Jod, Nitrogruppen, Alkoxygruppen, wie Methoxy, Äthoxy, oder Carbalkoxyreste, wie Äthoxycarbonyl, Methoxycarbonyl, substituiert sind.

Als Naphthylgruppe kommt insbesondere der  $\beta$ -Naphthylrest in Betracht.

Zweckmäßige Cycloalkylgruppen sind Cycloalkylreste mit 3 bis 10 C-Atomen im Ring, wie Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl.

Wenn  $R^1$  und  $R^2$  zusammen mit dem Stickstoffatom einen heterocyclischen Ring, der gegebenenfalls noch ein weiteres Heteroatom, wie Sauerstoff, Stickstoff oder Schwefel enthalten kann, bedeuten, sind heterocyclische Ringe mit 3 bis 10 Gliedern im Ring bevorzugt. Davon sind beispielsweise die cyclischen Imide der Vitamin A-Säure, wie das Piperidid, das Morpholid oder das Piperazid zu nennen.


Wenn  $R^1$  eine niedere Alkylgruppe, zweckmäßigerweise eine niedere Alkylgruppe mit 1 bis 4 C-Atomen, wie Methyl, Äthyl, Propyl, Butyl, Isobutyl, bedeutet, dann steht für  $R^2$  bevorzugt ein cycloaliphatischer Rest mit 3 bis 10 C-Atomen im Ring.

Beispiele hierfür sind das N-propyl-N-cyclohexylamid und das N-butyl-N-cyclohexylamid der Vitamin A-Säure.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen sind in an sich üblicher Weise herstellbar, indem man ein funktionelles Derivat der

2300107

Vitamin A-Säure, bevorzugt ein Vitamin A-Säurehalogenid, mit einem Amin der Formel II



worin  $\text{R}^1$  und  $\text{R}^2$  die oben angegebene Bedeutung haben, umgesetzt. Als funktionelle Vitamin A-Säurederivate kommen beispielsweise in Betracht Vitamin A-Säurechlorid, Vitamin A-Säurebromid, Vitamin A-Säureanhydrid, Vitamin A-Säurephenylester oder Vitamin A-Säureazid.

Das bevorzugte funktionelle Vitamin A-Säurederivat ist das Vitamin A-Säurechlorid, das zweckmäßig in Form einer Lösung in einem wasserfreien organischen Lösungsmittel verwendet wird. Hierzu kommen als Lösungsmittel in Betracht z.B. Diäthyläther, Benzol oder Toluol.

Es ist vorteilhaft, auch das Amin der Formel II in Form einer Lösung in einem organischen Lösungsmittel zu verwenden. Hierzu kommen ebenso als Lösungsmittel in Betracht beispielsweise Diäthyläther, Benzol oder Toluol.

Die bevorzugten Lösungsmittel für die Umsetzung sind Äther, insbesondere Diäthyläther, und aromatische Kohlenwasserstoffe, insbesondere Benzol.

Die Umsetzung erfolgt zweckmäßigerweise bei Temperaturen von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $50^{\circ}\text{C}$ , wobei die Reihenfolge der Zugabe unerheblich ist. Der bevorzugte Temperaturbereich liegt bei  $-20^{\circ}\text{C}$  bis Raumtemperatur.

Es ist vorteilhaft, die Reaktion in einer Inertgasatmosphäre und unter Vermeidung starker Lichteinwirkung durchzuführen.

Es ist zweckmäßig, den bei der Reaktion entstehenden Chlorwasserstoff mit einer stöchiometrisch äquivalenten Menge eines HCl-Acceptors abzufangen. Dazu können tertiäre Amine, wie Tri-

2300107

äthylamin oder Pyridin, oder ein entsprechender Überschuß des umzusetzenden Amins eingesetzt werden.

Die Aufarbeitung des Reaktionsproduktes geschieht in an sich üblicher Weise. Es kann vorteilhaft sein, das Endprodukt säulenchromatographisch, beispielsweise an neutralem Aluminiumoxid, zu reinigen. Eine bevorzugte und einfach durchzuführende Reinigung besteht jedoch in der Umkristallisation.

Als Amine der Formel II sind gemäß den für  $R^1$  und  $R^2$  angegebenen Bedeutungen beispielsweise zu nennen: Stearylamin, Cyclopropylamin, N-propyl-N-cyclohexylamin, N-butyl-N-cyclohexylamin, 3,4-Dimethylanilin, m-Nitroanilin, p-Fluoranilin, 2-Methylanilin, p-Aminobenzosäureäthylester, 2-Methoxyanilin, p-Äthoxyanilin,  $\beta$ -Naphthylamin, p-Chloranilin, m-Chloranilin, Piperidin, Morpholin oder Adamantylamin.

Die erfindungsgemäßen Vitamin A-Säureamide können in den dem Fachmann an sich bekannten Applikationsformen verwendet werden.

Die erfindungsgemäßen neuen Vitamin A-Säureamide können zur topischen und systemischen Therapie von Praeakanerosen und Karzinomen sowie zur systemischen und topischen Prophylaxe von Karzinomen verwendet werden. Sie können hierzu als solche oder in Kombination mit zytostatischen Mitteln sowie Strahlentherapie angewandt werden. Des weiteren können sie zur topischen und systemischen Therapie von Akne, Psoriasis und anderen mit verstärkter oder pathologisch veränderter Verhornung einhergehenden dermatologischen Affektionen sowie bei Ekzemen verwendet werden. Sie können auch bei Affektionen der Schleimhäute, die mit entzündlichen oder degenerativen bzw. metaplastischen Veränderungen einhergehen, verwendet werden. Als bevorzugtes Vitamin A-Säureamid ist das Vitamin A-Säureanilid-4-carbonsäureäthylester zu nennen.

Die an der Ratte und Maus durchgeführten Toxizitätsprüfungen ergaben folgende Resultate für die akute Toxizität:

2300107

Tabelle 1

Ratte

Vitamin A-Säuremorpholid in Olivenöl DAB 7

	<u>o r a l</u> mg/kg		
	nach 24 Std.	nach 14 Tagen	nach 28 Tagen
DL <sub>10</sub>	< 4000	< 4000	< 4000
DL <sub>50</sub>	> 6400	< 4000	< 4000
DL <sub>90</sub>	> 6400	6400	6400

	<u>intraperitoneal</u> mg/kg		
	nach 24 Std.	nach 14 Tagen	nach 28 Tagen
DL <sub>10</sub>	> 4000	< 4000	< 4000
DL <sub>50</sub>	> 4000	4000	< 4000
DL <sub>90</sub>	> 4000	> 4000	> 4000

Ratte

Vitamin A-Säure-pentamethylenimid in Olivenöl DAB 7

	<u>o r a l</u> mg/kg		
	nach 24 Std.	nach 14 Tagen	nach 28 Tagen
DL <sub>10</sub>	> 3000	2000	2000
DL <sub>50</sub>	> 3000	> 3000	> 3000
DL <sub>90</sub>	> 3000	> 3000	> 3000

	<u>intraperitoneal</u> mg/kg		
	nach 24 Std.	nach 14 Tagen	nach 28 Tagen
DL <sub>10</sub>	> 3000	3000	3000
DL <sub>50</sub>	> 3000	> 3000	> 3000
DL <sub>90</sub>	> 3000	> 3000	> 3000

2300107

Tabelle 2RatteVitamin A-Säureanilid-4-carbonsäureäthylester in Olivenöl DAB 7

	<u>o r a l</u> mg/kg		
	nach 24 Std.	nach 14 Tagen	nach 28 Tagen
DL <sub>10</sub>	> 6400	> 6400	> 6400
DL <sub>50</sub>	> 6400	> 6400	> 6400
DL <sub>90</sub>	> 6400	> 6400	> 6400

	<u>intraperitoneal</u> mg/kg		
	nach 24 Std.	nach 14 Tagen	nach 28 Tagen
DL <sub>10</sub>	> 4000	> 4000	> 4000
DL <sub>50</sub>	> 4000	> 4000	> 4000
DL <sub>90</sub>	> 4000	> 4000	> 4000

MausVitamin A-Säuremorpholid in Olivenöl DAB 7

	<u>o r a l</u> mg/kg		
	nach 24 Std.	nach 14 Tagen	nach 28 Tagen
DL <sub>10</sub>	> 6400	< 4000	< 4000
DL <sub>50</sub>	> 6400	< 4000	< 4000
DL <sub>90</sub>	> 6400	> 4000	> 4000

	<u>intraperitoneal</u> mg/kg		
	nach 24 Std.	nach 14 Tagen	nach 28 Tagen
DL <sub>10</sub>	> 6400	< 4000	< 4000
DL <sub>50</sub>	> 6400	< 4000	< 4000
DL <sub>90</sub>	> 6400	< 4000	< 4000

2300107

Tabelle 3MausVitamin A-Säure-pentamethylenimid in Olivenöl DAB 7

<u>o r a l</u> mg/kg			
	nach 24 Std.	nach 14 Tagen	nach 28 Tagen
DL <sub>10</sub>	> 3000	2000	2000
DL <sub>50</sub>	> 3000	< 3000	< 3000
DL <sub>90</sub>	> 3000	> 3000	> 3000

<u>intraperitoneal</u> mg/kg			
	nach 24 Std.	nach 14 Tagen	nach 28 Tagen
DL <sub>10</sub>	> 3000	3000	3000
DL <sub>50</sub>	> 3000	> 3000	> 3000
DL <sub>90</sub>	> 3000	> 3000	> 3000

MausVitamin A-Säureanilid-4-carbonsäureäthylester in Olivenöl DAB 7

<u>o r a l</u> mg/kg			
	nach 24 Std.	nach 14 Tagen	nach 28 Tagen
DL <sub>10</sub>	> 6400	6400	6400
DL <sub>50</sub>	> 6400	> 6400	> 6400
DL <sub>90</sub>	> 6400	> 6400	> 6400

<u>intraperitoneal</u> mg/kg			
	nach 24 Std.	nach 14 Tagen	nach 28 Tagen
DL <sub>10</sub>	> 6400	6400	6400
DL <sub>50</sub>	> 6400	> 6400	> 6400
DL <sub>90</sub>	> 6400	> 6400	> 6400



2300107

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, daß Vitamin A-Säureanilid-4-carbonsäureäthylester sowohl bei oraler als auch intraperitonealer Gabe von Ratten und Mäusen selbst in einer Dosierung von 6400 mg/kg Körpergewicht symptomlos vertragen werden.

In den folgenden Beispielen werden die Umsetzungen unter Stickstoff als Inertgas und unter Feuchtigkeitsausschluß durchgeführt. In den Beispielen verhalten sich die Gewichtsteile zu den Raumteilen wie das Kilogramm zum Liter.

#### Beispiel 1

##### Vitamin-A-Säurechlorid

Zu einer Suspension von 10 Gewichtsteilen Vitamin A-Säure in 150 Raumteilen trockenem Äther gibt man 2,8 Gewichtsteile trockenes Pyridin und tropft bei  $-10^{\circ}\text{C}$  eine Lösung von 4 Gewichtsteilen destilliertem Thionylchlorid in 5 Raumteilen trockenem Äther zu. Bei Raumtemperatur rührt man 1 Stunde. Das ausgefallene Pyridinhydrochlorid wird abgesaugt und das frisch hergestellte Vitamin A-Säurechlorid sofort zur Darstellung der Vitamin A-Säureamide eingesetzt.

##### Vitamin A-Säuremorpholid

Zu einer Lösung von 1,74 Gewichtsteilen Morpholin in 30 Raumteilen trockenem Äther tropft man bei  $-20^{\circ}\text{C}$  eine ätherische Lösung von 3,19 Gewichtsteilen frisch hergestelltem Vitamin A-Säurechlorid. Nach 3 Stunden Rühren bei Raumtemperatur wird abgesaugt, das Filtrat dreimal mit 200 Raumteilen Wasser gewaschen, getrocknet und eingeengt. Der Rückstand wird säulenchromatographisch an neutralem Aluminiumoxid (Laufmittel Hexan : Äther = 5:1) gereinigt und zweimal aus Isopropanol mit wenig Wasser umkristallisiert.

Ausbeute 76 % gelbe Kristalle

Fp.  $84-85^{\circ}\text{C}$      $E_1^{1110}$   
 $\lambda_{\text{max}}$  342 nm (Äthanol)

2300107

Analyse  $C_{24}H_{35}NO_2$

	% C	% H	% O	% N
ber.:	78,0	9,55	8,66	3,79
gef.:	77,7	9,6	8,8	4,1

### Beispiel 2

#### Vitamin-A-Säure-piperidid

Zu einer Lösung von 1,7 Gewichtsteilen Piperidin in 15 Raumteilen absolutem Äther läßt man bei Raumtemperatur eine frisch hergestellte ätherische Lösung von 3,19 Gewichtsteilen Vitamin A-Säurechlorid zutropfen. Nach 3 Stunden Rühren wird abgesaugt, das Filtrat viermal mit 100 Raumteilen Wasser gewaschen, getrocknet und eingeeengt. Der Rückstand wird an neutralem Aluminiumoxid (Laufmittel Hexan : Äther = 5:1) gereinigt und zweimal aus Aceton-Methanol-Wasser umkristallisiert.

Ausbeute 63 % gelbe Kristalle

Fp. 96-97°C

$E_1^{888}$   $\lambda_{max}$  338 nm (Äthanol)

Analyse  $C_{25}H_{37}NO$

	% C	% H	% O	% N
ber.:	81,69	10,15	4,35	3,8
gef.:	81,5	10,4	4,8	3,8

### Beispiel 3

#### Vitamin-A-Säurecyclopropylamid

Analog Beispiel 2

Lösungsmittel: trockenes Benzol

Reaktionszeit: 4 Stunden

2300107

Reaktionstemperatur: 40°C

Umkristallisieren aus wäßrigem Methanol

gelbe Kristalle Fp. 141°C

 $E_1^1$  1400  $\lambda_{\max}$  350 nm (Äthanol)Analyse  $C_{23}H_{33}NO$ 

	% C	% H	% O	% N
ber.:	81,35	9,8	4,71	4,12
gef.:	81,3	10,0	5,2	4,1

Beispiel 4Vitamin A-Säure-1-adamantylamid

Analog Beispiel 3

Beim Umkristallisieren aus Methanol schließt das Vitamin A-Säure-1-adamantylamid 1 Mol Kristallmethylethanol ein.

gelbe Kristalle Fp. 95-100°C

 $E_1^1$  1080  $\lambda_{\max}$  346 nm (Äthanol)Analyse  $C_{31}H_{47}NO_2$ 

	% C	% H	% N
ber.:	79,95	10,17	3,01
gef.:	79,5	10,0	3,2

Beispiel 5Vitamin-A-Säurestearylamid

Analog Beispiel 1

Säulenchromatographische Reinigung

Aluminiumoxid neutral Akt. III

2300107

Laufmittel Hexan : Äther = 9:1

Hexan : Äther = 5:1

dreimal aus Methanol umkristallisieren

blaßgelbe Kristalle Fp. 84-87°C

$E_1^{1800} \lambda_{\max} 346 \text{ nm}$  (Äthanol)

Analyse  $C_{38}H_{65}NO$

	% C	% H	% O	% N
ber.:	82,69	11,87	2,9	2,54
gef.:	83,1	11,6	2,9	2,7

#### Beispiel 6

##### Vitamin A-Säure-N-propyl-N-cyclohexylamid

Analog Beispiel 1 gelbes Öl

$E_1^{1116} \lambda_{\max} 337 \text{ nm}$  (Äthanol)

Analyse  $C_{29}H_{45}NO$

	% C	% H	% N
ber.:	82,21	10,71	3,31
gef.:	82,2	11,0	3,0

#### Beispiel 7

##### Vitamin A-Säure-N-butyl-N-cyclohexylamid

Analog Beispiel 1 gelbes Öl

$E_1^{993,5} \lambda_{\max} 338 \text{ nm}$  (Äthanol)

Analyse  $C_{30}H_{47}NO$

	% C	% H	% O	% N
ber.:	82,32	10,82	3,66	3,20
gef.:	82,6	11,2	4,0	2,9

Beispiel 8Vitamin A-Säure- $\beta$ -naphthylamid

Zu einer frisch hergestellten ätherischen Lösung von 9,57 Gewichtsteilen Vitamin A-Säurechlorid und 5 Raumteilen Pyridin gibt man eine ätherische Lösung von 4,3 Gewichtsteilen  $\beta$ -Naphthylamin. Nach einstündigem Rühren wird das Reaktionsgemisch dreimal mit 100 Raumteilen Wasser, zweimal mit 100 Raumteilen 0,2 n Natronlauge, mit verdünnter Schwefelsäure und nochmals mit Wasser gewaschen. Die ätherische Phase wird getrocknet und eingengt, der Rückstand dreimal aus Methanol umkristallisiert.

Ausbeute 50 %                      gelbe Kristalle

Fp. 171-172°C

$E_1^{1224}$        $\lambda_{\max}$  367 nm      (Äthanol)

Analyse       $C_{30}H_{35}NO$

	% C	% H	% O	% N
ber.:	84,66	8,29	3,76	3,29
gef.:	84,6	8,4	4,1	3,4

Beispiel 9Vitamin-A-Säure-3,4-dimethylanilid

Zu einer ätherischen Lösung von 12,1 Gewichtsteilen 3,4-Dimethylanilin gibt man eine frisch hergestellte Lösung von 15,95 Gewichtsteilen Vitamin A-Säurechlorid. 4 Stunden wird gerührt und unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Absaugen wird die ätherische Phase viermal mit Wasser gewaschen, getrocknet und eingengt. Der Rückstand wird viermal aus Äthylalkohol umkristallisiert.

Ausbeute 56 %                      gelbe Kristalle

Fp. 159-160°C

2300107

E<sub>1</sub><sup>1</sup> 1344  $\lambda_{\max}$  364 nm (Äthanol)Analyse C<sub>28</sub>H<sub>37</sub>NO

	% C	% H	% O	% N
ber.:	83,32	9,24	3,96	3,47
gef.:	83,36	9,4	4,1	3,5

Beispiel 10

Analog zu Beispiel 9 wurden folgende Vitamin A-Säureamide hergestellt:

a) Vitamin A-Säure-(p-fluor)-anilid

gelbe Kristalle Fp. 168-169°C

E<sub>1</sub><sup>1</sup> 1343  $\lambda_{\max}$  362 nm (Äthanol)Analyse C<sub>26</sub>H<sub>32</sub>FNO

	% C	% H	% F	% N
ber.:	79,38	8,20	4,83	3,56
gef.:	79,3	8,2	4,9	3,9

b) Vitamin A-Säure-(m-nitro)-anilid

gelbe Kristalle Fp. 174-175°C

E<sub>1</sub><sup>1</sup> 899  $\lambda_{\max}$  364 nm (Äthanol)Analyse C<sub>26</sub>H<sub>32</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

	% C	% H	% O	% N
ber.:	74,25	7,67	11,41	6,66
gef.:	74,5	7,8	11,1	6,8

c) Vitamin A-Säure-(2-methyl)-anilid

gelbe Kristalle Fp. 127-138°C

$E_1^1$  1392  $\lambda_{\max}$  357 nm (Äthanol)

Analyse  $C_{27}H_{35}NO$

	% C	% H	% O	% N
ber.:	83,24	9,06	4,11	3,6
gef.:	83,0	9,1	4,2	3,7

d) Vitamin A-Säureanilid-4-carbonsäureäthylester

gelbe Kristalle Fp. 177-178°C Ausbeute 56 %

$E_1^1$  1339  $\lambda_{\max}$  370 nm (Äthanol)

Analyse  $C_{29}H_{37}NO_3$

	% C	% H	% N
ber.:	77,81	8,33	3,13
gef.:	77,5	8,5	3,4

e) Vitamin-A-Säure-(2-methoxy)-anilid

gelbe Kristalle Fp. 179-181°C

$E_1^1$  1347  $\lambda_{\max}$  363 nm (Äthanol)

Analyse  $C_{27}H_{35}NO_2$

	% C	% H	% O	% N
ber.:	79,96	8,70	7,89	3,45
gef.:	80,3	9,0	8,1	3,4

f) Vitamin A-Säure-(p-äthoxy)-anilid

gelbe Kristalle Fp. 183-185°C

$E_1^1$  1174  $\lambda_{\max}$  363 nm (Äthanol)

Analyse  $C_{28}H_{37}NO_2$

2300107

	% C	% H	% O	% N
ber.:	80,15	8,89	7,63	3,34
gef.:	80,1	9,1	7,5	3,5

g) Vitamin-A-Säure-(m-chlor)-anilid

gelbe Kristalle Fp. 179-180°C

 $E_1^{1030}$   $\lambda_{\max}$  365 nm (Äthanol)Analyse  $C_{26}H_{32}ClNO$ 

	% C	% H	% O	% N	% Cl
ber.:	76,2	7,85	3,93	3,42	8,67
gef.:	75,8	7,9	4,3	3,5	9,1

h) Vitamin-A-Säure-(p-chlor)-anilid

gelbe Kristalle Fp. 187-188°C

 $E_1^{1363}$   $\lambda_{\max}$  365 nm (Äthanol)Analyse  $C_{26}H_{32}ClNO$ 


	% C	% H	% O	% N	% Cl
ber.:	76,2	7,85	3,93	3,42	8,57
gef.:	76,1	8,2	4,3	3,6	8,3

Die Strukturen aller Vitamin A-Säureamide wurden durch IR- und NMR-Spektren bestätigt.



Patentansprüche

1. Vitamin A-Säureamide der Formel I




I,

in der einer der Reste  $R^1$  Wasserstoff und  $R^2$  eine Alkylgruppe mit mehr als 10 C-Atomen, eine substituierte Phenylgruppe, eine Naphthylgruppe, eine Cycloalkylgruppe oder eine Polycycloalkylgruppe oder  $R^1$  und  $R^2$  zusammen mit dem sie verbindenden Stickstoffatom einen Ring, der gegebenenfalls ein weiteres Heteroatom enthält, oder  $R^1$  eine niedere Alkylgruppe und  $R^2$  einen cycloaliphatischen Ring bedeuten.

2. Vitamin-A-Säure-stearylamid
3. Vitamin-A-Säure-N-propyl-N-cyclohexylamid
4. Vitamin-A-Säure-N-butyl-N-cyclohexylamid
5. Vitamin-A-Säure-3,4-dimethylanilid
6. Vitamin-A-Säure-(m-nitro)-anilid
7. Vitamin A-Säure-(p-fluor)-anilid
8. Vitamin-A-Säure-(2-methyl)-anilid
9. Vitamin A-Säureanilid-4-carbonsäureäthylester
10. Vitamin A-Säure-(2-methoxy)-anilid
11. Vitamin A-Säure-(p-äthoxy)-anilid
12. Vitamin-A-Säure-β-naphthylamid
13. Vitamin-A-Säure-morpholid
14. Vitamin-A-Säure-piperidid
15. Vitamin-A-Säure-(p-chlor)-anilid
16. Vitamin-A-Säure-(m-chlor)-anilid
17. Vitamin-A-Säure-cyclopropylamid

2300107

18. Vitamin A-Säure-1-adamantylamid
19. Zubereitung, enthaltend eine oder mehrere Verbindungen des Anspruchs 1.
20. Verfahren zur Herstellung von Vitamin A-Säureamiden der in Anspruch 1 genannten Formel, dadurch gekennzeichnet, daß man ein funktionelles Vitamin A-Säurederivat mit einem Amid der Formel II



in der  $\text{R}^1$  und  $\text{R}^2$  die angegebene Bedeutung haben, umsetzt.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG

①